







2011

Vacunas recomendadas para bebés

 al nacer	HepB	
 2 meses	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV 1-2 meses	
 4 meses	DTaP + PCV + Hib + Polio + RV	
 6 meses	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV 6-18 meses*	(Influenza) 6 meses a 18 años**
 12 meses	MMR + PCV + Hib + Varicela + HepA 12-15 meses* 12-15 meses* 12-15 meses* 12-15 meses* 12-23 meses*	(Influenza) 6 meses a 18 años**
 15 meses	DTaP 15-18 meses*	(Influenza) 6 meses a 18 años**

Descripción de las vacunas:

HepB: protege contra la infección por el virus de la hepatitis B

DTaP: protege contra la difteria, el tétano y la tos ferina

Hib: protege contra las infecciones por *Haemophilus influenzae* Tipo b, incluyendo meningitis bacteriana

PCV: protege contra la infección neumocócica

Polio: protege contra la poliomielitis; esta vacuna se conoce también como IPV

RV: protege contra las infecciones causadas por el rotavirus

Influenza: protege contra la influenza (gripe)

MMR: protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola (sarampión alemán)

Varicela: protege contra la varicela

HepA: protege contra la infección por el virus de la hepatitis A

NOTA: Si le falta una vacuna, a su niño, no necesitará comenzar de nuevo, solo vuelva al doctor para la próxima vacuna. El doctor le ayudará a mantener al día las vacunas de su niño.

* Esta vacuna se debe poner en este rango de edad.

** Se recomienda que todos los niños de 6 meses a 8 años reciban 2 dosis de la vacuna contra la gripe 2010-11 con un intervalo de 4 o más semanas **a menos que** hayan recibido:

1. al menos 1 dosis de la vacuna contra la gripe H1N1 2009 durante la última temporada de gripe, **y**
2. al menos 1 dosis de la vacuna contra la gripe de temporada **antes** de la temporada de gripe 2009-2010 o 2 dosis de la vacuna contra la gripe de temporada 2009-10 durante la última temporada de gripe

Si el niño ha cumplido con ambos requisitos, solamente necesita 1 dosis de la vacuna contra la gripe 2010-11.

Para más información, llame gratis al **1-800-232-4636**
o visite <http://www.cdc.gov/vaccines>

Los calendarios de vacunación recomendados para los niños del nacimiento hasta los 18 años de edad están aprobados por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (<http://www.cdc.gov/vaccines/recs/acip>), la Academia Americana de Pediatría (<http://www.aap.org>) y la Academia Americana de Médicos de Familia (<http://www.aafp.org>).



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention